ЛП-№(000344)-(РГ-RU) от 13.10.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.10.2025 № 25400
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Структум®, 500 мг, капсулы

Действующее вещество: хондроитина сульфат

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Структум® и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Структум®
3. Прием препарата Структум®
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Структум®
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Структум® и для чего его применяют

Препарат Структум® содержит хондроитина сульфат и относится к группе препаратов под названием «противовоспалительные и противоревматические препараты; нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты; другие нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты».

Показания к применению

Препарат Структум® применяется у взрослых (старше 18 лет) при лечении остеоартроза, в том числе остеоартрита (артроза) позвоночника.

Способ действия препарата Структум®

Структум® помогает улучшить обмен веществ в разных типах хрящей, уменьшает их повреждение и способствует восстановлению. Он также замедляет разрушение костей и помогает удерживать кальций, ускоряя их восстановление. При использовании Структум® уменьшается боль и улучшается движение в больных суставах, эффект сохраняется надолго после окончания лечения.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.10.2025 № 25400
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

2. О чем следует знать перед приемом препарата Структум®

Противопоказания
Не принимайте препарат Структум®:

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) на хондроитина сульфат или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности
Перед приемом препарата Структум® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Дети и подростки
Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Структум®
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание
Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
В качестве предупредительной меры предпочтительно не применять Структум® во время беременности.
Не следует применять Структум® в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Специальные исследования по влиянию на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводились. Препарат Структум® может вызывать головокружение (см. раздел 4 листка-вкладыша). При появлении головокружения не рекомендуется садиться за руль или использовать потенциально опасные инструменты и механизмы.

Препарат Структум® содержит 45,7 мг натрия (основной компонент пищевой/столовой соли) в 1 капсуле. Это эквивалентно 2 % от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей. Следует это учитывать, если Вы находитесь на диете с ограничением потребления натрия.

3. Приём препарата Структум®

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
Рекомендуемая доза: по 1 капсуле 500 мг 2 раза в день (1 г в сутки).
Только для взрослых.

Путь и (или) способ введения
Препарат принимают внутрь. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая большим стаканом воды.
Продолжительность терапии
Продолжительность курса лечения определяется врачом.
Если Вы приняли препарата Структум® больше, чем следовало

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.10.2025 № 25400
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

В редких случаях возможны проявления симптомов передозировки (тошнота, рвота, диарея).
Немедленно обратитесь к врачу или работнику аптеки.
Следует начать симптоматическое лечение.

Если Вы забыли принять препарат Структум®

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.
При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Структум® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.
Прекратите прием препарата Структум® и **немедленно обратитесь за медицинской помощью** в случае возникновения одного из следующих симптомов **серьезных нежелательных реакций:**
редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):
ангионевротический отек (внезапный отек лица, языка и/или горла, рук и/или ног), способный вызвать затруднение дыхания. Срочно требуется медицинское вмешательство.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Структум®:
часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
головокружение, диарея, боль в животе и тошнота.
нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):
сыпь с ощущением зуда и жжения (крапивница), кожная сыпь, зуд (раздражение) и отек лица (припухлость).
редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):
рвота, покраснение (эритема).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт: https://roszdravnadzor.gov.ru

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, 13 (БЦ «Нурсаулет 2»)
Телефон: +7 7172 235-135
Электронная почта: pdlc@dari.kz
Сайт: www.ndda.kz

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.10.2025 № 25400
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

Республика Беларусь
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
220037, Республика Беларусь, г. Минск, Товарищеский пер., 2а
Телефон: +375 17 242-00-29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт: www.rceth.by

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве Здравоохранения Кыргызской республики
Адрес: 770044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25
Телефон: 0800 800-26-26; +996 312 21-92-86
Электронная почта: dlomt@pharm.kg
Сайт: www.pharm.kg

5. Хранение препарата Структум®

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.
Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Хранить при температуре ниже 25°С.
Не выбрасывайте препарат в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Структум® содержит

Действующим веществом является хондроитина сульфат.
Каждая капсула содержит 500 мг хондроитина сульфата натрия.
Прочим ингредиентом (вспомогательным веществом) является: тальк.
Оболочка капсулы: титана диоксид (Е171), краситель индигокармин (Е132), желатин.

Внешний вид препарата Структум® и содержимое упаковки
Капсулы
Твердые желатиновые капсулы, крышечка и корпус – от светло-голубого до голубого цвета. Содержимое капсул – агломерированный порошок от белого до желтоватого цвета.
По 12 капсул в блистере из пленки поливинилхлоридной/ поливинилиденхлоридной и алюминиевой фольги, по 5 блистеров вместе с листком-вкладышем в пачке картонной.
По 20 капсул в блистере из пленки поливинилхлоридной/ поливинилиденхлоридной и алюминиевой фольги, по 3, 4, 5, 6, 7 или 10 блистеров вместе с листком-вкладышем в пачке картонной.
Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Держатель регистрационного удостоверения
Франция
Пьер Фабр Медикамент
Ле Кокийу, 81500, Лавор, Франция

Производитель
Франция
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Прогифарм, Рю дю Лисе, 45500 Жиен, Франция

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 09.10.2025 № 25400
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0009)

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

На территории Российской Федерации:
ООО «Пьер Фабр»
Россия, 119048, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники,
ул Усачёва, д. 2, стр.1, помещ. 2/1
Тел.: +7 495 789 9533
Эл. почта: info.pfrussia@pierre-fabre.com

На территории Республики Казахстан:
Представительство АО «EUROMEDEX», Франция
Казахстан, 050009, г. Алматы, пр. Абая, д.153, кв.13.
Тел.: +7 727 394 34 08
E-mail : office.kz@euromedex.com

На территории Республики Беларусь:
Представительство АО «EUROMEDEX», Франция
Беларусь, 220092, г. Минск, ул. Бельского, д.15, оф.107.
Тел.: +37517 3 945 945

На территории Республики Кыргызстан:
Представительство АО «EUROMEDEX», Франция
Кыргызстан, 720005, г. Бишкек, Переулок Геологический 5
Тел.: +996 704 391 612

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации
Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза http://eec.eaeunion.org